

Pharmaka zur Beruhigung des stehenden Pferdes:

Handelsname	Chemische Bezeichnung	Dosierung in ml / 100kg	Bemerkungen /NW
Sedalin® oder Vetranquil®	Azepromazin	0.3 - 1ml i.m. od. i.v.	Wirkung nach ca. 10 Min. (i.v.) bzw. 15-20 Min. (i.m.) für ca. 60 Min. (bis höchstens 4 h), nur für gesunde Pferde, weil starke Blutdrucksenkung Nicht immer Sedation erzielbar
Rompun®(2%)	Xylazin	2 - 5 ml i.v.	Wirkung nach ca. 2 Min. für ca. 10 - 15 Min., NW am wenigsten dramatisch und am kürzesten aller Sedativa für Pfd., bei Schmerzen schlagen Pferde.
Domosedan®	Detomidin	0.1 -0.3 ml i.v. od. i.m.	Wirkung nach ca. 2 Min. (bzw. 10 Min. nach i.m.) für ca. 1 - 2 Std., Pferde schlagen aus bei Schmerz.
Sedalin® +Rompun® +Polamivet®	siehe oben Methadon	0.4 ml 2 ml Mischspritze i.v. 2 ml	Wirkung nach ca. 2 Min. für ca. 60 -100 Min., verlässliche, tiefe Sedation.
Rompun® +Polamivet®	siehe oben	2 - 3 ml Mischspritze i.v. 2 - 3 ml	Wirkung nach ca. 2 Min. für ca. 20 - 30 Min., verlässliche Sedation, relativ geringe NW auf Kreislauf.
Domosedan® +Morphasol®/Alvegesic®	siehe oben Butorphanol	0.05-0.1 ml Mischspritze i.v. 0.2 ml (bei leichten Pferden ev. etwas höher dosieren)	Wirkung nach ca. 2 Min. für 60 - 90 Min., sehr tiefe verlässliche Sedation, gute viszerale Analgesie, Pfd. schlagen weniger aus als nur mit Xylazin oder Detomidin.

Allgemeinanästhesie beim Pferd:

Prämedikation	Einleitung	Unterhaltung	Bemerkungen
Xylazin 1 mg/kg i.v. (=5 ml Rompun [®] 2%/100kg)	Ketamin 2 mg/kg i.v. (= 2ml Narketan [®] 10%/100kg) + Diazepam 0.02 mg/kg i.v. * (=0.4 ml Valium [®] /100kg)	Inhalationsanästhesie oder 0.5 mg/kg Xylazin + 1 mg/kg Ketamin * alle 10 Min. i.v.	Xylazin langsam über 2 Min. spritzen, gut für z.B. Kastration
Xylazin 1 mg/kg i.v. (=5 ml Rompun [®] 2%/100kg)	Ketamin 2 mg/kg i.v. (= 2ml Narketan [®] 10%/100kg), am lie- genden Pfd.: 0.2 mg/kg Climazolam i.v. (= 2 ml Climasol [®] /100kg)	6 mg/kg/h Ketamin + * 0.4 mg/kg/h Climazolam i.v. Antagonist 20 Min. nach letzter Ketaminapplikation: 0.04 mg/kg Sarmazenil i.v. (=4 ml Sarmasol [®] /100 kg)	Nur Einleiten, wenn Pfd. gut sediert ist; viszerale Analgesie schlecht, nicht für Kastration geeignet; super für Fohlen Nie auf Antagonist verzichten
Xylazin 0.05-1 mg/kg i.v. (=2.5-5 ml Rompun [®] 2%/100kg)	Myolaxin [®] 15% ca. höchstens 1 ml/kg so schnell wie möglich i.v., schwankt Pfd: 4-6 mg/kg Thiopental i.v. (=4-6 ml/100kg Pentothal [®] 10%)	Inhalationsanästhesie oder Thiopental nach Wirkung i.v.	I.d.R. unsanftere Einleitung und Aufwachphase als nach Ketamineinleitung, einfachere Intubation

* Mischspritze